

# 出穂期を確認し、刈取計画を立てましょう！

## 1 北陸地方1か月予報（令和2年7月30日 新潟地方气象台発表）

- ・向こう1か月の平均気温は高い確率 50%です。
- ・平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

## 2 収穫適期めやす（8月4日現在）

- ・積算温度による刈取適期のめやすは、こしいぶきが975°C、コシヒカリが1000°Cです。
- ・平坦地は小出アメダス地点、山間地は守門アメダス地点のデータを基に試算しています。
- ・今後の気温が平年よりも高温で推移した場合は、収穫日を2日程度早めましょう。
- ・下記表を参考に収穫適期を把握し、早めに作業計画を立てましょう。

品種 (地域)	移植日	出穂期	収穫期予想	
			平年	高温年
こしいぶき (平坦地)	5月13日	7月26日	9月3日	8月31日
コシヒカリ (平坦地)	5月15日	8月4日	9月13日	9月11日
	5月20日	8月7日	9月17日	9月15日
	5月25日	8月10日	9月21日	9月18日
コシヒカリ (山間地)	5月15日	8月5日	9月17日	9月15日
	5月20日	8月8日	9月21日	9月18日
	5月25日	8月12日	9月27日	9月24日

（今後更新される積算温度表は、JA営農センター、普及センターのホームページ等で入手できます）

不明な点は農協営農センターまたは普及センターまでおたずねください。携帯メール会員募集！営農センターへお問い合わせください。