R3 積算温度による早生品種の刈取適期予想(平坦地)　早生品種の刈取適期(975℃～1025℃)

9月7日 までの気温は本年の小出アメダスデータ値、　　9月7日　現在

9月8日　以降の気温は過去10年の平均値により算出　　JA北魚沼・魚沼農業普及指導センター

		積算温度による刈取適期予想(早生品種)																							
		8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10
出穂期	7/15	893	919	945	971	997	1022	1047	1072	1097	1124	1149	1174	1198	1222	1240	1261	1283	1305	1327	1348	1369	1393	1416	1439
	7/16	866	892	918	944	970	995	1020	1045	1070	1097	1122	1147	1171	1195	1213	1234	1256	1278	1300	1321	1342	1366	1389	1412
	7/17	838	864	890	916	943	967	992	1017	1042	1069	1094	1119	1143	1167	1185	1206	1228	1250	1272	1293	1314	1338	1361	1384
	7/18	811	837	863	888	915	940	964	989	1014	1041	1066	1091	1115	1139	1157	1178	1201	1222	1245	1265	1287	1310	1333	1356
	7/19	782	808	834	860	886	911	936	961	986	1013	1038	1063	1087	1111	1129	1150	1172	1194	1216	1237	1258	1282	1305	1328
	7/20	755	781	807	832	859	884	908	933	958	985	1010	1035	1059	1083	1101	1122	1145	1166	1189	1209	1231	1254	1277	1300
	7/21	728	754	780	806	832	857	882	907	931	958	984	1009	1032	1056	1075	1096	1118	1140	1162	1183	1204	1227	1250	1273
	7/22	701	727	753	779	805	830	855	880	905	931	957	982	1005	1030	1048	1069	1091	1113	1135	1156	1177	1201	1224	1247
	7/23	673	699	725	751	777	802	827	852	876	903	929	954	977	1001	1020	1041	1063	1085	1107	1128	1149	1172	1195	1218
	7/24	647	673	699	724	751	776	800	825	850	877	902	928	951	975	994	1014	1037	1058	1081	1101	1123	1146	1169	1192
	7/25	620	646	672	698	724	749	774	799	823	850	876	901	924	948	967	988	1010	1032	1054	1075	1096	1119	1142	1165
	7/26	593	619	645	671	698	722	747	772	797	824	849	874	898	922	940	961	983	1005	1027	1048	1069	1093	1116	1139
	7/27	570	595	622	647	674	699	723	748	773	800	825	850	874	898	916	937	960	981	1004	1024	1045	1069	1092	1115
	7/28	544	570	596	622	648	673	698	723	747	774	800	825	848	872	891	912	934	956	978	999	1020	1043	1066	1089
	7/29	519	545	571	596	623	648	672	697	722	749	774	800	823	847	866	886	909	930	953	973	995	1018	1041	1064
	7/30	493	519	546	571	598	622	647	672	697	724	749	774	798	822	840	861	884	905	928	948	969	993	1016	1039
	7/31	467	493	519	545	571	596	621	645	670	697	723	748	771	795	814	835	857	879	901	921	943	966	989	1012

品種ごとの目安

品種	出穂後積算気温
こしいぶき 北陸一二号	975℃
つきあかり	1,100～1,200℃

※ 通常年の積算温度による刈取適期のめやすは、975℃。表中は975℃～1,025℃に色をかけている。(高温条件の場合は、2日程度早く収穫する)

※ 刈取適期に収穫作業のピークとなる計画を立てましょう。

※ 最終的な収穫適期の判断は、穂の黄化率から判断しましょう。(通常年の収穫適期は、穂の黄化率85～90%)